

The logo for DASA, consisting of the lowercase letters 'dasa' in a bold, sans-serif font. The letters are a vibrant cyan color. The background of the entire page is a deep blue with a pattern of light blue dots of varying sizes, arranged in a grid-like fashion that fades out towards the edges.

dasa

Calendário SBIM  
Sociedade Brasileira  
de Imunizações  
**2019.2020**

# CALENDÁRIO VACINAL SBIM 2019/2020 DO NASCIMENTO À TERCEIRA IDADE.

<https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-0-100.pdf>. Acessado em 19/08/2019



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE															ADOLESCENTE	ADULTO	IDOS	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS					
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos				5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos	20 a 59 anos
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente													Vacinar pessoas contactantes de hanseníase			SIM	SIM	NÃO				
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento						Vacinar os não vacinados anteriormente														SIM	SIM	SIM	
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.			CONTRAINDICADA															SIM	SIM	NÃO			
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw), iniciando aos 2 meses de idade						REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)										SIM, DTPw e dT dTpa para gestantes	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa		
Haemophilus influenzae tipo b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade						REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, três primeiras doses	SIM	SIM, até 19 anos		
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade						REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, três primeiras doses	SIM	SIM		
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade						REFORÇO	VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC13: uma dose			SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10					
Meningocócicas conjugadas	Men ACWY - duas ou três doses a depender do fabricante, iniciando aos 3 meses de idade Men C - duas doses iniciando aos 3 meses de idade						REFORÇO	REFORÇO		REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM, menC para menores de 5 anos e adolescentes de 11 a 14 anos	SIM	SIM, menC						
Meningocócica B	Duas doses, iniciando aos 3 meses de idade						REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente - De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses De 24 meses a 19 anos: duas doses				Vacinar pessoas em situações especiais de risco				NÃO	SIM	NÃO						
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO															SIM	NÃO	NÃO						
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL															SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos	SIM	SIM						
Febre amarela	EM REGIÕES COM RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO - Dose única a partir dos 9 meses de idade. A recomendação de uma segunda dose, especialmente para os vacinados antes de 2 anos de idade, não é consensual, mas deve ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.															SIM	SIM	NÃO						
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses						Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, até 49 anos	SIM	NÃO						
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses						Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM	SIM	SIM						
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses						Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM						
HPV							Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses		Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)		Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos)	SIM	SIM						
Pneumocócica 23 valente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco															Duas doses com intervalo de cinco anos			NÃO	SIM	SIM			
Herpes zóster																De 50 a 59 anos: a critério médico			Uma dose			NÃO	SIM	NÃO
Dengue	CONTRAINDICADA															Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 - 6 - 12 meses			CONTRAINDICADA			NÃO	SIM	NÃO

19/06/2019 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos Calendários de vacinação SBIM 2019/2020 e nos Calendários de vacinação SBIM pacientes especiais.

\* Consultar manual do CRIE em [www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual\\_procedimentos\\_2014.pdf](http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf)  
Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os Calendários de vacinação SBIM pacientes especiais





**núcleo  
de assessoria  
médica**

**41 3299 9212**  
**41 9 8427 7944**

**dasa**